

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元已集卷之六

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男

龔廷國 龔安國 金校

南雍太學生蓋印周文卿光霽堂鐫

頭痛

脉頭痛短滿應須死浮滑風痰必易除寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛  
夫頭者諸陽所聚之處也諸陰至頸而還惟足厥陰有絡上頭至顙頂其  
脉浮緊弦長洪大者屬風熱痰火而致也其脉微弱虛濡者屬氣血兩  
虛必丹田竭而髓海空為難治也甚有真頭痛者脉無神而腦中發勞  
痛其心神煩亂為真頭痛也且發夕死夕發旦死益頭痛暴起者如瘧  
塞發熱惡寒乃感冒所致也其曰頭痛者有虛有火有痰厥頭痛者有

偏有正益左邊宜小柴胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荊子酒炙其眉稜處痛者二陳湯加酒炒片苓羌活薄荷其腦頂痛者宜入參敗毒散加川芎藁本酒炒黃柏木瓜紅花酒炒大黃

○一論一切頭痛主方不問左右偏正新久皆效

清上蠲痛湯

當歸酒洗一錢小川芎一錢 白芷一錢 細辛三分

羌活一錢 獨活一錢 防風一錢 菊花五分

蔓荊子五分 蒼朮米泔浸一錢 片苓酒炒一錢 麥門冬一錢

甘草生三分

右剉一劑生薑煎服

一左邊痛者加紅花七分柴胡一錢草龍膽酒洗七分生地黃一錢

一右邊痛者加黃芪一錢乾葛八分

一正額上眉棱骨痛甚者食積痰壅用天麻五分半夏一錢山查一錢

枳實一錢

一當頭頂痛者加藁本一錢大黃一錢酒洗

一風入腦髓而痛者加麥門冬一錢蒼耳子一錢木瓜荆芥各五分

一氣血兩虛常有自汗加黃芪一錢五分人參白芍生地黃各一錢

○一論年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭

痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚

癢痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻注頭目昏痛

並皆治之

追風散

防風去蘆一兩荆芥穗一兩羌活五錢川芎一兩

白芷五錢全蝎去毒尾五錢天麻五錢白僵蠶一兩炒

白附子炮五錢石膏煨一兩天南星炮一兩川烏炮去皮尖一兩

草烏

炮去尖

地龍 五錢

雄黃 二錢五分 乳香 二錢五分

沒藥

二錢五分

甘草 炙一兩

右為細末。每服五分。茶湯調食。後臨臥服。清頭目。利咽喉。消風化痰。

○一論痰厥頭痛。其症眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促上喘。無方以言。心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。此乃胃氣虛損。停痰而致也。

半夏白朮天麻湯

黃柏

酒洗

一分

乾薑

炒二分

澤瀉

澤瀉

白茯苓

去皮

天麻

黃芪

蜜炒

人參

蒼朮

米泔浸炒

神麴

白朮

去蘆炒

麥芽

炒

半夏

姜炒

陳皮

各七分半

右剉生薑三片。水煎。熱服。可下劑而愈。

○一論頭痛偏左者。屬血虛火盛也。

加味四物湯

當歸

川芎

生地黄

黃柏

酒炒

知母

酒炒

蔓荊子

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

梔子

炒

藁本

各等分

右剉一劑水煎溫服○風盛加防風荊芥

○一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也

黃芪益氣湯

黃芪

蜜炒

人參

白朮

去蘆

陳皮

半夏

姜汁炒

當歸

酒洗

川芎

藁本

甘草

炙各五

升麻

黃柏

酒炒

細辛

各三分

右剉一劑薑棗煎服

○一論頭左右俱痛者氣血兩虛也

調中益氣湯

黃芪

蜜炒

人參

甘草

炙

蒼朮

米泔浸

川芎

各六分

升麻

柴胡

陳皮

黃柏

酒炒

蔓荊子各三分

當歸六分

細辛二分

右剉水煎溫服。

○一論偏正頭風。下切頭痛諸風眩暈頭目昏重

都梁丸

香白芷切碎晒乾爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸荊芥點腦茶細嚼下

○一論眉脊骨痛者風熱并痰也

選奇湯

羌活

防風各二錢酒片苓

一錢五分冬月不用或甚苦炒用

半夏

姜汁炒

甘草

一錢夏月生冬月炙

右剉下剉水煎食後服

○一論雷頭風者頭痛而起核塊也頭面疼痛憎寒發熱拘急狀如傷寒

升麻湯

升麻

蒼朮 米泔浸

薄荷葉各等分

右剉水煎服

○一譚侍御但頭痛卽吐清水不拘冬夏吃薑便止已三年矣余作中氣虛寒用六君子加當歸黃連木香炮薑而瘥

○一論頸項強急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

○一治偏正頭痛頭風

羌活

白芷

細辛

川芎

蔓荊子

薄荷

防風

甘草

各等分

右爲細末每服二三茶匙白湯調下

○一人頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數日乾引飲遍古生刺宿敏如荔枝然下唇里裂而目俱赤煩燥不寐或時喉間如烟火上衝急



飲涼茶少解已至于死脉洪大而無倫且有力捫其身烙手此腎經虛火遊行于外投以十全大補加山茱澤瀉牡丹山藥麥門五味附子一錢熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後此冷物

○一治頭風腫痛偏正不拘用艾槌爛鋪帛上將快捲成筒次將黃蠟溶化灌入筒內以滿為度如左邊疼將藥燒烟入右耳右邊疼即安

○一論半邊頭痛

祛痛膏

防風

羌活

蔓本

細辛

菊花各五分

南星

草烏

白芷各

錢

右為末用連翹葱下把洗淨同煎藥搗成膏銅鍋頓熱草烏大小以油帶攤藥貼痛處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛即止一方加菊花獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

# 鬚髮

醫者所論人鬚髮眉雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白眉髮不白者或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也。大率髮屬於心。黑氣故上生。鬚屬於腎。黑氣故下生。眉屬於肝。故側生。男子腎氣上行上爲鬚。下爲勢。故女子宮人無勢。則亦無鬚。而眉髮無異於男子。則知不屬腎也明矣。

婦人無鬚無血氣乎。岐伯曰。今婦人之生有餘于氣。不足于血。衝任之脉不榮唇口。故鬚不生。

宦者其鬚獨去其故何也。曰。宦者傷其宗筋。血泄不復。皮膚故鬚不生。

天宦未嘗被傷其鬚不生其故何也。曰。天宦稟賦不足。宗筋不成。故鬚不生。天下第一烏鬚方。 閣老高中玄傳

五倍子一斤。擇整箇者。箇箇槌破。去蟲土。擇粗粉如黃豆大。火者如

赤豆六文次者如藁豆大分三樣入新鍋內炒如栗殼色以青濕布包之以脚踏成餅晒乾爲末錫罐盛貯築實封口勿令泄氣藥用紅銅末半斤淘去皮土見清水令乾入鐵鍋內炒太熱傾入醋少半碗拌勻濕透再炒入醋七次研爲末羅過以絹帛另包聽用

白礬四兩爲末另包

皂礬四兩爲末另包

白芨四兩切片焙乾

研爲細末帛包

右每遇染髮時量髮髻多少用藥如五倍子九錢銅末一錢八分白礬白芨皂礬各九分再加食鹽九分共入于碗內再研極細入小銅杓內以濃茶調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不住手攪勻熬成稠糊爲度預先以肥皂水洗淨髮髻待乾以根子挑藥乘熱塗髮髻上用油紙兜住外用烏帕包裹至頂解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾用手搜去殘藥如乾甚用茶滴濕潤去藥至天明洗面擦洗髮髻如面皮上生瘡處以指蘸香油塗摩即用軟帛擦去油時染後仍以香油少許潤之即

明黑可觀先一月染三四次後半月染一次永不落白

野狐倒上樹 尚書劉三才傳

黑鉛四兩 汞二錢

右先將鉛化成汁後入汞凝成其子剪成錢樣外用鐵絲穿作十二串  
聽用再用木磁罐一箇入無鹽好醋三碗將鉛錢入罐內懸於醋上醋  
醋二指內泡着指一箇鴨嘴膽礬四錢用磁碟封口蓋之再用黃泥封  
固夏月日中晒七日冬月糠火煨七日出罐底摘一孔出醋不用揭起  
碟來掃下藥霜來用脂皮包住收之臨用藥時將頭髮用溫水洗淨就  
濕再用脂皮包手指沾藥霜黏在頭髮上自然黑到根神効切忌香肥  
皂水洗

烏髮方 刺史周如梅傳

官粉一兩五分 白礬三錢

麝香一分 輕粉二分

白石灰二錢 樟腦二分  
百草霜八分

水銀一錢先將銀一錢化開入水銀結成砂子

右為末用鹹水和熬濃塗鬚髮上燒半炷香即洗去

青雲獨步丹 烏鬚黑髮延年益壽

赤白何首烏共三斤用黑豆二升半煮汁浸首烏一晝夜去汁水將

赤茯苓半斤用牛乳浸過煮乾白茯苓半斤用牛乳浸過煮乾

兔絲子半斤酒浸煮搗爛焙乾當歸身酒洗三兩

補骨脂鹽酒炒四兩甘枸杞酒浸焙三兩

懷牛膝甘草水泡四兩懷生地黃酒浸入砂仁三錢同蒸

真沒藥一兩五錢去砂土

右忌鐵器晒乾為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸空心酒下午間

薑湯下臨臥薑湯下忌二百

造酒烏鬚方 本府奏推府傳

懷生地黃四兩真牛薑汁四兩赤白何首烏各一斤新為水製過地黃

小紅棗肉

三兩

大當歸二兩

麥門冬

去心

二兩

胡桃肉

三兩

蓮肉

三兩

土蜜

三兩

右先用酒洗淨地黃將何首烏水去渣入地黃煮俟乾再用薑汁水浸乾爲度便將地黃搗爛以二官斗糯米水十片作酒麴藥加常俟酒漿來方以水調勻地黃入酒糟內過三日去糟將前藥切片入絹袋中懸酒罈內箊殼包封毋令出氣放鍋內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中二宿去火毒任意飲三五杯

烏鬚秘方用龜尿

研墨塗鬚烏立時

要取龜尿亦有法

猪鬃刺鼻龜卽尿

烏鬚秘方

用馬蝗蜞尋起數條帛包要用時將雞血或猪血將馬蝗入血內令食飽針出血同龜尿同研墨濃塗鬚髮上可烏一月乃烏鬚第方也

烏鬚神妙方

本府蘇通府傳

五倍子

炒黑為末

銅末一鍋

白芨末八分

食鹽三分

沒石子末三分

白礬三分

黑礬三分

細辛末三分

柯子末三分

右為細末。熟茶調稀。重湯煮入黑礬再煮。面上生光。搽鬚上。油盛裏煮。烏鬚狐狸倒上樹。周賓崇傳自蜀中得來。

山茄要極黑者。收約有八九升來。去蒂以夏布包洗去漿水。將山茄扭自然汁四五碗。入上等好墨四五錢。打碎。黑礬四五錢。一味俱入山茄汁內。貯新瓦罐中。每用將竹片蘸藥汁于鬚髮上。自尾倒上切。莫粘肉上。則洗不去了。

○一論烏鬚生髮良方

蒲公英

摘淨切

血餘

洗淨四兩

青鹽

四兩研

右用磁罐

一箇

盛蒲公英一層

血餘一層

青鹽一層

鹽泥封固

五日。夏三。日冬七日。桑柴火煨。令烟盡為度。候冷取出。碾為末。每服一

錢侵晨酒調下。

- 一儒者因飲食勞役及惱怒鬚髮脫落余以爲勞傷精血陰火上炎所致用補中益氣加麥門五味及六味地黄丸加五味鬚髮頓生如故。
- 一男子年二十頂髮脫盡用六味地黄丸不數日髮生寸許兩月復舊。
- 一史萬湖云有男女偶合鬚髮脫落無藥調治至數月後復生。

## 面病

難經曰人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽明胃之經起鼻交額中入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癢疹或面熱面寒隨其經症而治之。

○一論面寒者陽明經虛寒也。

升麻附子湯



升麻

葛根

白芷

黃芪

各七分

大附子炮七分

人參

草豆蔻

各五分

益智仁

三分

炙甘草

五分

右剉一剉連麝香白一兩根水煎溫服。

○一論面熱者陽明經風熱也。

升麻黃連湯

升麻

葛根

各一錢

白芍

七分

川芎

四分

薄荷

荆芥

各三分

蒼朮

八分

半黃連

酒洗

五酒

琴

六分

犀角

白芷

二分

甘草

五分

右剉水煎食後服。

○一論面生瘡者上焦火也。

清上防風湯

防風

一錢

荆芥

五分

連翹

八分

山梔

五分

黃連

五分

黃芩

酒炒

七薄荷

五分

川芎

七分

白芷

八分

桔梗

八分

枳殼五分 甘草三分

右剉一劑水煎入竹瀝同服。

○一論面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻白芷湯

升麻

防風

白芷各一錢芍藥

蒼朮各三分

黃芪

人參各七分 葛根一錢半 甘草四分

右剉一劑薑棗煎服宜早後午前取天氣上升於中使陽達於面也

○一論面生粉刺者肺火也

清肺飲

連翹

川芎

白芷

黃連

黃芩

荊芥

桑皮

苦參

山梔

貝母

甘草各等分

右剉水煎臨臥服

○一點痣方

以巴豆七箇石灰等分爲末以鹹水搜在葷內藏糯米於巴豆石灰內候米爛將痣用針撥動以米膏點之絕三日不洗自然脫落

○一起字出青方

礦石灰

紫蓼灰各一錢人參五錢

鹹一錢

加百草灰

辣蓼灰各一兩

右爲末水調寫字上有泥起拂去再上

○一出刺青方

馬肉不拘多少儘令蒼蠅作壤生蛆出晒乾爲末以針撥動青處擦藥其青自出

○一抓破面皮

用生薑自然汁調輕粉搽患處更無痕迹

○一洗面方

每早以漱口水吐在掌中洗面久久自然光潤粉刺自消

○一治赤紅爛臉

水銀一錢 柏油蠟一錢 共搗塗之

○一治面上瘡鼻酒刺

雄黃一錢 硫黃五分 鉛粉一錢

右共爲末乳汁調塗晚上敷次日溫水洗之如此三上去矣

# 耳病

脉兩寸脉浮洪上魚爲溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰抑陽○左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其入必遺精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

耳者屬腎而開竅於少陽之部通食於手三陽之間坎離交則聚氣以司聰而善聽也開於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通其耳鳴

耳痒耳聾者皆屬腎虛水不上頭清氣不升所致也從補益門治之其壯年及小兒耳腫耳痛耳停乃三陽風熱壅遏所致也宜升陽散火湯加黃柏知母晚間兼服金花丸可矣。○黃連解毒湯大黃

○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥丸而氣不聚故耳鳴耳重不聽及耳內痒。

安神復元湯

黃芪

蜜炒五分

一錢人參一錢五分當歸酒洗五分一錢柴胡一錢

升麻

五分

黃連

酒炒一錢黃芩酒炒一錢黃柏酒炒一錢

知母一錢

防風一錢

蔓荊子七箇

甘枸杞子一錢五分

麥門冬一錢

茯神一錢

小草一錢

酸棗仁炒一錢五分

甘草五分

右剉一劑圓眼肉三枚水煎服。

○一論勞傷氣聾風聾虛聾毒聾及聾耳鳴勞聾者火鼓其聽戶也氣

聾者經氣滯塞於聽戶也。風聾者風熱閉其聽戶也。虛聾者氣血虛耗而神不用也。毒聾者膿血瘴礙於聽戶也。久聾者病非一日邪氣聚也。凡是聾者勢必耳鳴故總繫其耳鳴也。

千金補腎丸

當歸酒洗

白芍酒炒

懷熟地黃酒蒸黃芪蜜炒

人參

白茯苓去皮木

山茱萸酒蒸去核牡丹皮

澤瀉

兔絲子酒製

蛇床子

肉苁蓉

石斛

乾薑

桂心

大附子炮去皮臍

巴戟去心

遠志去心

細辛

甘草各二兩

石菖蒲一兩

防風一兩五錢羊腎二枚

共二十三味

西園公加山藥二兩殊效

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸加至三四十丸溫酒下

○一論虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿咽喉

不利煩燥不寧

通明利氣湯

蒼木一錢 鹽水炒

白木一錢 去蘖炒

撫芎八分

陳皮二錢 鹽水浸

香附一錢 童便炒

貝母三錢

生地黃一錢 姜汁浸

黃連一錢 半酒浸

黃芩一錢 半酒浸

黃柏二錢 酒炒

梔子仁炒二錢

玄參二錢 酒洗

木香五分

檳榔一錢

粉草炙四分

右剉二劑。生薑水煎。入竹瀝同服。

○一論陰虛火動而耳聾或鳴者。

六味地黃丸見補益依本方加黃柏知母。石菖蒲遠志去心屢驗。

○一治耳鳴主方

黃連

黃芩

梔子

當歸

陳皮

膽星各一錢龍膽草

香附各八分玄參七分

青黛

木香各五分乾薑炒黑三分

右剉一劑生薑三片煎七分入玄明粉三分痰盛加五分食後服如作  
九子加藟膏五分麝香二分爲末神麴糊爲丸每服五十九淡薑湯送  
下如腎虛而鳴者服六味地黃丸

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也  
射干散 苦竹吳紹源傳

升麻

桔梗

射干

昆布

連翹

甘草

右剉水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛神效

○一治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾

生烏頭一味搗得乘濕削如棗核大塞耳且易夜易不三日愈

○一論塞藥治耳聾殊效

石菖蒲一寸

巴豆一粒去壳全蝎一箇去足尾

右爲末葱涎爲丸如棗核大綿裹塞耳即通



○一論塞耳專治耳聾或因病因氣及感風邪而聾者若年老者耳聾或  
蚯蚓去土陰乾為末七分麝香三分用葱截寸許塞藥于內左聾塞  
右耳右聾塞左耳左右俱聾兩耳俱塞

○一治耳聾

通靈丹

安息香一分 桑螵蛸一分 阿魏一分 朱砂五分

草麻子仁七箇 巴豆仁七箇 獨蒜七箇

右為細末入三仁與蒜同研為丸如棗核樣每用一九綿聚入耳內覺  
微痛即去

○一論停耳生膿并黃水

紅綿散

枯白礬五分 乾胭脂粉二分 麝香少許 片腦一分

熟爐甘石五分

右爲末先以棉杖子展乾膿水另將搗翎管子送藥入耳底○下方用  
蛙竹粉易塞甘亦效

○一治耳空腫出膿水

用枯礬爲末以筆管吹耳內日三四次或以綿裹塞耳中

○一治上熱耳出膿汁

甘草炙

升麻

木通

赤芍

桑白皮炒

生地黃

前胡

赤茯苓

蔓荊子

甘菊花各等分

右剉薑棗煎服

○一治人耳如蟬鳴服四物湯耳鳴甚此元氣虛損之症五更服六味  
丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而有火用八珍湯加山梔柴  
胡氣虛而有火四君子湯加山梔柴胡若因怒即聾或鳴實用小柴胡  
加芎歸山梔虛用補中益氣加山梔午前甚用四物加白朮茯苓久須  
用補中益氣午後甚用地黃丸

○一論治人因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡合四物加山  
梔茯苓陳皮而瘥

○一論耳鳴因虛火妄動心神不寧以益氣湯去升麻參芪加半斤茯苓  
川芎白芍竹茹黃柏黃連天麻蔓荊子細辛

○一治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以瘥爲度○一法以礬炭灰火  
中煨之用良

○一治耳鳴肺火盛腎氣虛以四物湯四錢黃柏三錢童便煎空心服

○一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡湯加  
生地以抑其血而愈又頃間結核如貫珠寒熱用加味歸脾湯加味道  
遙散調補肝脾而愈

六味丸方見補益補中益氣湯方見內傷八珍湯方見補益四君子湯方  
見補益四物湯方見補益小柴胡湯加味道遙散加味歸脾湯  
方俱見婦人虛勞

○一專治耳鳴耳聾

獨勝丸

川黃柏去皮，小兩入乳拌勻，曬乾，再用鹽水炒，褐色。

右爲細末，水糊爲丸，如梧子大，每服百丸，空心鹽湯送下。

○一治耳內腫痛膿血出

白礬枯末入麝香少許，吹耳中，日三四度，或綿裹塞耳中，立瘥。

○一治耳聾

細辛爲末，鎔黃蠟爲丸，如鼠屎大，綿裹塞耳中，又宜灸耳前兩中，壯。

○一治氣道壅塞兩耳聾

用甘草如棗核大，綿裹塞耳中，却以甘草放口內，隨嚥又宜生葱白塞耳內，頻換，卽通。

鼻病

○一治腦痛  
○一論肺熱鼻流濁涕鼻塞不通又治鼻不聞香臭  
神愈散  
○一論肺熱鼻流濁涕鼻塞不通又治鼻不聞香臭  
神愈散

細辛白芷與防風  
十般等分剉和同

羌活當歸半夏  
三錢薄荷薑煎服

桔梗茯苓陳皮  
氣息調勻鼻氣通

○一治腦痛

防風

荆芥

獨活

連翹

藁本

辛夷

甘草

細辛

牙皂

石菖蒲

右剉水煎服如數服未效可將後藥三味為末綿裹塞鼻內即效

○一論鼻流濁涕不止者名曰鼻淵乃風熱在腦傷其腦氣腦氣不固而液自滲泄也。

蒼耳散

白芷一兩

辛夷仁

蒼耳炒各一錢薄荷五錢

右剉水煎服

○一論鼻中流出臭膿水名曰腦漏

辛夷散

辛夷花一錢

黃芪一錢

人參一錢五分當歸一錢

白芍一錢

川芎一錢

白芷一錢

細辛八分

黃芩酒炒一錢甘草六分

右剉一剉燈心三十根水煎食遠服

○一治頰疳或鼻疳

乳香

沒藥各五分

孩兒茶一錢

雞腔脬焙黃色一錢

方爲末，搽患處。

○一老人鼻中流涕，不乾。

獨蒜四五箇搗如泥，貼腳底心，下用帛貼之，其涕再不發。

○一男子酒齕鼻。

雄猪膽每日早以好酒調服一箇，不過半月如舊。

○一治糟鼻方。

用硫黃爲細末，甚者加草烏尾爲末，以酥油調，後塗患處，如覺痛苦，用梔子煎湯服之，或洗藥處，卽愈。

○一論鼻赤久不瘥，用大黃芒硝、檳榔等分爲末，水調敷患處，三四次洗淨，以新銀杏去殼嚼爛，敷於鼻上，不過五七次復舊。

○一治赤鼻。

檳榔爲片，將茄汁浸晒一二次爲末，面上紅壘硫黃以人乳浸滿碗，頓入湯鍋煮乾，先須用唾濕鼻，方味藥上。

○一論鼻淵頭眩  
清泥丸飲神湯

人參

防風

麥門冬去心當歸頭

枯苓酒炒

小草

黃連酒炒各一錢蔓荊子八分升麻

生甘草各三分

明天麻

半夏製各七分

右剉水煎食遠服○腦漏者加蒼耳子二錢黃芪一錢

○一論鼻流涕久而不愈乃成腦漏必因虧損元陽以致外寒內熱甚則有滴下腥臭之惡者也知保養服藥方可

加味防風湯

防風一錢

人參一錢

片苓酒炒一錢白芨一錢

麥門冬去心生甘草五分

當歸頭一錢白芍一錢

懷生地酒洗

黃柏酒炒一錢黃芪一錢

黃連酒炒一錢

知母一錢

百合一錢



右劉水煎食遠溫服

○一論鼻涕長流名鼻淵也

當歸

川芎

白芷

人參

白茯苓

麥門冬

防風

秦艽

荊芥

薄荷

蒼耳子

香附子

蔓荊子

甘草各一兩天竺黃三錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三四十九米湯下

○一男子面白流清涕不聞聲穢三年矣用補中益氣湯加麥門山梔而愈

○一論色慾太過虛損白濁鼻軌出清涕如泉湧者

補中益氣湯方見內傷依本方加黃柏知母白芷細辛藁本五味子白芍

辛夷蒼耳葉水煎溫服

○一論肺虛爲四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

川芎

白芷

細辛

藁本

防風

辛薤仁

木通

甘草

右判水煎溫服

○一治鼻中肉贅臭不可近痛不可搖以

白礬末加硃砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯合瀉白散下  
劑此厚味擁濕熱蒸於肺門如雨霖之地突生芝蘭也

○一治鼻中肉贅

用藕節有毛處下節燒灰存性爲末吹患處立瘥

○一治血熱入肺名曰酒齋鼻此丸主之

苦參 淨末四兩當歸 淨末二兩

右和勻酒糊爲丸如梧子大每服七八十丸食後熟茶下

○一治鼻疳爛通鼻孔 予治陳都憲未人患此得効

鹿角 一兩

白礬 一兩

俱放在瓦上隔火煨過

人頭髮 五錢

在燈火上燒過

右爲末先用花椒湯洗淨搽藥於疳上三四次即愈如瘡不收口用瓦

松燒灰存性研末乾擦之即收

○一人酒瘡鼻紅赤用此方晚服用六味地黃丸全料加當歸二兩苦參四兩空心服不兩月而愈

金花丸

黃連二兩

枯苓二兩

黃柏二兩

梔子二兩

大黃九次一兩

酒蒸桔梗二兩

白粉葛二兩

右爲細末井水丸如梧子大每服七八十丸白溫水下

# 口舌

脉左寸洪數心熱苦○右寸浮數肺熱口辛○左關弦數而虛膽虛口苦甚洪而實肝熱口酸○右關沉實脾胃有實熱口甘兼洪數者口瘡或爲重舌木舌脉虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈者宜理中湯夫口舌之爲病或爲重舌木舌或爲糜爛生瘡之類經云肝熱則口酸心

熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，有口淡者，胃熱也。口  
鼻者，乃臟腑燥腐之氣，結積於胸膈之間，而生熱，衝發於口也。口瘡者，  
脾氣凝滯，加之風熱，而然也。治當以清胃瀉火湯主之。此正治之法也。  
如服涼藥不已者，乃上焦虛熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當  
分別而治之。如發熱作渴，飲水，口瘡者，上焦虛熱也，補中益氣湯主之。  
如手足冷，肚腹作痛，大便不實，飲食少思，口瘡者，中焦虛寒也，附子理  
中湯主之。如哺熱內熱，不時而熱，作渴，痰唾，小便頻數，口瘡者，下焦陰  
火也。六味地黃丸主之。如食少便滑，面黃肢冷，火衰土虛也，八味丸主  
之。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，若從脚起，乃  
無根之火也，亦用八味丸。及十全大補湯，加麥門、五味，更以附子末，唾  
津調搽湧泉穴。若藥用涼藥，損傷生氣，為害匪輕。

○一論心肺蘊熱，口瘡咽痛，腸悶，小便淋瀝不利，  
清金導赤散

黃連

黃芩

梔子

木通

澤瀉

生地黃

麥門冬

甘草

右剉生薑三片水煎食後頻服

○一論上焦實熱心胃二經之火而作口舌生瘡腫痛者并咽喉牙齒耳面腫痛皆効

清胃瀉火湯

連翹

桔梗

黃連

黃芩

梔子

玄參

升麻

生地黃

薄荷

五分

甘草三分

乾葛

七分

右剉水煎頻頻溫服

○一論飲酒過度舌本強腫言語不清此脾虛濕熱以益氣湯加神麴麥

芽乾葛澤瀉

○一論上焦虛熱發熱作渴飲水勞則體倦此內傷氣血而作口舌生瘡

補中益氣湯方見內經依本方加麥門冬五味子

○一論中焦虛寒手足冷肚腹痛太便不實飲食少思而作口舌生瘡以附子理中湯方見中寒依本方

○一論肺熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數而作口舌生瘡者此下焦陰火也以

六味地黃丸方見補益依本方

○一論如食少便滑面黃肢冷如作口舌生瘡者此火衰土虛也以八味丸方見補益依本方

○一論若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處而作口舌生瘡者若從脚起乃無根之火也以

八味丸及十全大補湯方見補益依本方加麥門冬五味子

○一論口瘡鼻氣穢爛久而不瘥者用黃柏五錢青黛一錢五分爲末每用一錢於舌上津嚥下

○一論口瘡用黃連川椒等分爲末每少許搽瘡上噴漱良久以涼水漱  
嚥咽喉有瘡加孩兒茶

○一治口舌生瘡

加味陰陽散

黃連

乾薑

青黛

孩兒茶各等分

右爲末每用少許搽患處立效○丁方用五倍子爲末搽瘡上愈

○一治口瘡良方 徐杏庄老師傳

生白礬一錢

朱砂二分

右共爲末敷上立愈

○一論口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽痰涎清聲潤肺寬胸除熱

上清丸 黃濱江傳

百藥煎四兩

薄荷清沫四兩砂仁二兩

訶子五錢

桔梗五錢

甘松五錢

寒水石二兩

玄明粉五錢

礞砂五錢

片腦一錢

右爲末甘草熬膏丸如梧子大每服三五丸茶清下

○一論曰瘡連年不愈者此虛火也

玄門丹

天門冬去心

麥門冬去心

玄參各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸噙化下

○一人口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此中氣虛寒而外虛熱也  
用加減八味丸而愈

○一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本故舌下其熱當  
責於心脾二經經所謂熱勝則腫也用葶麻子去殼暴炙後出油搗  
作撚燒烟薰之而愈本草云葶麻子浮腫惡氣取油塗之藥主風腫不  
仁搗熟敷之則其能解風腫因熱也可知矣

○一人胃弱痰涎口舌生瘡彼服滾痰丸愈盛反瀉不止惡食倦怠此胃



氣被傷也。予以香砂六君子湯數劑。少可再。以補中益氣湯。加茯苓半夏而愈。夫胃氣不足。飲食不化。亦能爲痰。補中益氣。乃治痰之法也。苟虛症。而用峻利之劑。鮮不危哉。

○丁人脾胃虛。服養胃湯枳朮丸。初有效。而久反虛。口舌生瘡。勞則愈盛。此中氣虛寒。用理中湯。少愈。更以補中益氣湯。加半夏茯苓。而安。夫養胃湯。香燥之劑也。若飲食停滯。或寒滯中焦。服則燥開胃氣。宿滯消化。最爲近理。使多服。則津液愈燥。胃氣愈虛。況胃氣本虛。而用之。豈不反其其病哉。亦有房勞過度。真氣衰敗。或元氣不足。不能上蒸中州。不運致飲食不進者。以補真丸治之。若丹田之火上蒸脾土。脾土溢和中焦。自治飲食自進。何口瘡之不愈哉。

○一人舌青黑。有狀如熱劇也。良由思慮過度。致氣所得。病者要將舌來去壁。上貼之。方好。予製此方。卽效。

清心散

赤茯苓去皮一錢

酸棗仁一錢

麥門冬去心一錢

遠志五分 水泡去心

黃連一錢

胡麻仁一錢

枳殼去穢八分 小木通八分

小甘草三分

右剉水煎溫服

○一男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎經虛熱以六味丸悉愈

○一治口瘡喉痛牙疼妙藥 陳上余傳

硼砂一錢

孩兒茶二分 雄黃二分

青黛一厘

玄明粉一厘

胡黃連三厘 冰片一厘

右共研末擦止

○丁香茹治口氣甚捷蓋口臭是脾胃有鬱火溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干故也

○一補舌唇方 賈蘭峰傳

用鮮蠟燒灰每二錢用乳香沒藥各二分半塗之即生肉如去多唇  
舌用川烏草烏爲末攤帛一條以涼水調令貼之即不覺痛可用刀  
取如流血以陳石灰塗之愈後舌硬用白雞冠血點之即軟

○一生舌方

用活蟹一箇炙乾爲末收之如遇此患敷上合口即已

○一治舌上腫硬

用百草霜海鹽等分爲末井花水調敷患處○又宜眞蒲黃末頻搽  
舌上內以黃連一味煎湯服以瀉心火

○一治舌長過寸研水片敷之即收

一治舌無故血出如泉槐花炒爲末搽之立止

一治舌忽脹出口外俗云是蜈蚣毒用雄雞冠血一小盞浸之即縮入

○一舌吐不收名曰陽強

一舌縮不能言名曰陰強

○一男子舌常破而無皮狀或咽喉作痛服清咽利膈散愈時子以理中湯治之乃愈

# 蘭唇

內經云脾氣通於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則爛寒則揭若唇腫起白皮皴裂如蠶齒名曰齒唇有唇腫重出如齒者有本細末大如齒如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳按脾經或因厚味積熱傷脾太要審本病察兼症補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不察妄用清熱消毒之藥或用藥線搗去皮反爲翻花敗症矣

○一論肝經怒火風熱傳脾唇腫裂或患唇蘭唇

柴胡清肝散

柴胡

黃芩炒各一錢黃連一錢五分山梔七分

當歸一錢五分 川芎六分 生地黃二錢 升麻二錢五分

牡丹皮一錢五分 甘草三分

右剉丁劑水煎食後頻服若脾胃弱去苓連加白朮茯苓

○一論陰虛火動唇燥裂如繭

濟陰地黃丸

熟地黃自製 山茱萸酒蒸 乾山藥 遼五味子

麥門冬去心 當歸身 肉苁蓉 甘枸杞子

甘菊花 巴戟肉各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○一論中氣傷損唇口生瘡或齒牙作疼惡寒發熱肢體倦怠食少自汗或頭痛身熱煩燥作渴氣喘脉大而虛或微細軟弱

補中益氣湯

人參 黃芪 蜜水炒 甘草各一錢五分 白朮土 蒼朮

當歸

橘紅各一錢

柴胡

升麻各五分

右剉下剉薑棗煎服。

- 一論唇紫燥裂生瘡用微攪燒灰爲末以猪油調塗患處立已。
- 一論冬月唇乾血出用棗仁搗爛猪油調塗唇上即効。

牙齒

脉右寸關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛○尺脉洪大而虛者腎虛主齒動搖踈豁相火上炎而痛。

夫牙齒有乃骨之萃也骨乃腎主之則諸經血脉津液皆潤澤清涼矣蓋血足則涼涼即骨堅固血虛則熱熱則齒浮動人之上唇人中之下牙屬督脉下前齒屬任脉其兩頤上下及環口皆屬手陽明二經故牙床屬土牙齒猶如木栽土上土涼則根固土熱則焦搖牙即骨也骨不能療其痛者牙齦筋肉也人食梅多者牙即癢麻痒而不能力嚼者非不

酸制土耶。其牙斷肉脫胃火也。牙疎脆者腎之相火也。經曰諸痛痒瘳瘻皆屬心火。緣心火之下陰精承之。若承之者不缺何痛之有。其牙患之名有風牙蟲牙牙疳牙宣。蓋由一火之不齊也。故熱則生風風字有虫。又曰血遇火則沸而出牙宣也。熱兼外邪則腫痛。真陰未成而熱熾者曰疳。乃潰塌之速。凡爲治者保腎水者知其本清胃火者知其標疎風邪者知其權。蓋風藥善通經開腠則是火鬱宜發之義耳。修養家常食淡些則血不凝戒慎厚味甘辛香辣則不積火治牙至藥不効時熱之積也。蓋因縱慾而陰虛嗜味以爲補而益增其火。其目下嗜慾之節乃爲後邊晚景不甚苦於牙也。稟陽明火多者易作牙病也。凡用椒姜巴豆薑擦性熱辣者擦而定痛雖快於一時實乃資邪益深矣。戒之戒之。其小兒牙疳牙痛者悉以甘嗜以味而不知節厚其衣重其緇而不知識乳兒作疳者母之遺熱也。烘焙絳綿夜煖圖於睡眠况實陰未成所以爲害甚也。固不可不留心究明於斯矣。○經云腎衰則齒齕。

精固則齒堅

○一論一切牙齒腫痛皆屬胃經火盛多是辛熱厚味及服溫暖之藥過多以致胃熱上下牙痛牽引頭腦面熱其齒喜冷惡熱者加味清胃散

當歸尾

生地黄

牡丹皮

升麻

黃連

加防風

荊芥

軟石膏各等分

右剉水煎服

若牙齦額半邊痛者加防風白芷羌活細辛

若牙齦脫而血出者加扁柏葉黃芩荊芥梔子

若虛損人牙痛者加黃柏知母人參甘草

若滿口浮而痛不能力嚼者加連翹玄參芍藥

小兒牙疳者乳母服加天花粉玄參白芷

醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛連頭面頸項作痛者並加犀角連翹



甘草○胃寒齒痛加草豆豉細辛防風羊脛骨灰去牡丹皮  
○一論胃得實熱齒痛或上片痛尤甚者  
涼膈飲

連翹

梔子

大黃

酒蒸為君

芒硝

黃芩

薄荷

知母

升麻

石膏

黃連

甘草各等分

右剉水煎頻服

○一論風牙疼痛

草烏

二錢米泔水浸去皮炒焦

細辛一錢

全蝎稍五錢洗去躁

白殭蠶

五條炒去嘴

水片一分

右研勻搽患處開口流涎內服清胃散

○一治牙風腫痛

涼牙散

軟石膏一兩

川烏三錢

草烏三錢

花椒三錢

右俱生用爲末擦牙漱口吐之立已

○一陳省齋遇一道人治牙痛如神

巴豆

去壳三枚真川椒七粒

右先將川椒略焙爲末次入巴豆同研極爛入紅米飯此須搗研爲末

丸如黍米大每用一丸貼痛處

○一陳恕軒治牙痛不可忍者

花椒炒

胡椒

白礬半生半枯食鹽炒

右各爲末合和同研每少許擦痛處吐涎即止

○一治風冷齒痛

白芷

細辛

良薑

萆撥

川椒

香附

蜂房炒

右各等分爲末擦牙搗鼻

○一治牙痛方。

黑豆一兩炒鹽六錢

花椒五錢

生薑六錢

連翹葱六錢

艾六錢

右白水煎漱口吐去

○一論牙屬腎骨之餘不作痛作痛者乃手足陽明經之火沸血壅牙根齒齦浮起作痛也宜清胃火為主其牙齒疎脆剝下漸覺齒稀牙蛀去乃屬腎之真陰虧欠牙木敗壞矣宜服六味地黃丸

滋陰清胃固齒丸 善治牙疼且能固齒

山藥末一兩

牡丹皮末一兩

黃柏酒炒末一兩

黃連酒炒末一兩

升麻末一兩

當歸酒洗末一兩

玄參末一兩

乾葛末一兩

右用知母一兩山查肉二兩煎濃湯去渣淨汁煮葛粉為糊又用細米飯一盞研爛和葛粉同又研勻調上公味末為丸如棗豆大以水飛過朱砂為衣晒乾每服三十錢食後白湯送下要急一切厚味辛辣

諸甜等物

一治胃經虛熱齒牙作痛者

補中益氣湯方見內傷依本方加熟地黃牡丹皮白茯苓白芍藥

一治齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾盛者

補中益氣湯方見內傷依本方加酒炒黃柏知母

一治每勞心則齒縫脹而不能咀嚼此元氣虛弱也

補中益氣湯方見內傷依本方

一論齒浮作痛耳內響已口乾作渴日晡則劇此脾虛也用益氣湯加

減八味丸而愈

一朱土部午後有熱遺勞遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用補中益氣

送六味丸更以十全大補湯而愈

一男子齒浮作痛耳內響已口乾作渴日晡則劇此脾虛弱也用補中

益氣湯加減八味丸而愈

一男子口臭牙齦赤爛腿膝軟或用黃柏等藥益腎時或口鹹此腎經虛熱余用六味地黃丸悉瘥

一男子每足發熱牙即浮腫此足三陰虛火用加減八味丸而不復作

一論腎氣虛寒牙齒作痛面色黧黑精神憔悴脚膝無力飲食少思或痰氣上升小便頻數齒不堅固或口舌麻悶畏飲冷水以八味丸而安

一治胃中客熱牙疳去血口臭齒齦腫痛腐爛

甘露飲子

枇杷葉

石斛

黃芩

枳殼

天門冬

麥門冬

生地黄

熟地黄

山茵陳

甘草

右剉水煎服

○一李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙疳也諸醫不効忽遇一道人傳方一擦即愈

川椒炒

錢半 銅青一錢

硼砂一錢

右三味為末，每少許擦患處，流涎立止。

○一治牙疳，牙根內臭爛，黑色，有蟲作痛。

雞內金即雞脾腔內粗皮白芷五錢

銅青一錢 麝香一分

右為細末，用溫鹽水漱口，貼患處。

○一治牙疳，臭爛久不愈。

白礪砂一錢 白礬枯一錢 蘼香五分 青黛二分 輕粉二分

雄黃二分 冰片一分

右為細末，候睡去時，以竹管引藥吹在牙疳上，或以雞翎掃敷之。

○一論牙痛或腫，風牙蟲牙，牙動牙長，痛不可忍，宋知府傳。

馬蜂窩 白蒺藜 花椒 艾葉 葱頭

荊芥 細辛 白芷 各等分

右剉散，醋煎，口含良久，吐出即瘥。

○一治牙痛，蟲蛀不亡，諸藥無効者。

救苦丹

蟾酥三分剉細乳升也少溶化磁盞內雄黃二分細辛二分

冰片二分

右將酥乳調和細細納在蛀牙孔內或痛牙齦縫中口中涎任流出之內服加味清胃湯

○一方治蟲牙腫痛用雄黃一分麝香少許搽於蟲孔中蟲死痛止

○一治風牙蟲牙作痛

用黃蠟蜂窠一箇以花椒填滿其竅以白蠟一錢封口燒存性入白芷羊脛骨灰各一錢同研為細末先以清茶漱口淨然後以藥搽之及數痛處如有新蛀孔作痛以少許塞孔中立驗

固齒明目烏髮黑髮良方

牙痛胃火

厚味所起

齒動腎虛

房勞過矣

補腎牙牢

清火痛止

節然其淡

何疾不愈

經驗良方

擦牙固齒

明目烏鬚

香口潤體

久而用之

其妙無比

何首烏

黑豆煮汁拌蒸四次

牛膝拌蒸一次

早蓮草

日南

槐角

黑豆煮汁拌蒸四兩

懷生地黃

酒拌砂鍋內蒸一日至

骨碎補

去皮毛炒七次

一兩五

青鹽

二兩

沒石子

公母成對二兩

右共為細末每早擦牙滾水嚥下能用於鬚髮未白之光可免染髮之

勞烏鬚黑髮百歲不白固齒牢牙永世不落真仙方也

牢牙固齒烏鬚黑髮秘方

臨川劉雲素傳

沒石子

四錢

青鹽

二兩

細辛

一兩

熟地黃

二兩

破故紙

炒二兩

地骨皮

二兩

右共為細末每早擦牙良久滾水嚥下

擦牙烏鬚方

本縣丁侯傳



白茯苓 去皮

細辛

牙皂 灰存五倍子 炭黑

右各等分爲細末頻頻擦牙日久鬚自黑

○一擦牙固齒牙宜口臭烏鬚黑髮 吏部吳繼疎試効

旱蓮草 陰乾切碎半斤

香附米 四兩

右二味入砂鍋炒黑存性爲末擦牙

○一固齒烏鬚 王斗岳傳

青鹽 炒一兩

槐角子

炒一兩 牡丹皮 酒洗一兩

破故布 酒炒七錢

細辛 酒洗五錢

熟地黃

酒洗二兩 沒石子 三錢

百藥煎 二錢

右共爲末每早擦牙嚥下

○一擦牙防齒患

取青槐枝 搗半碎半斤水四碗煎二碗去渣入好鹽丁在火上乾更將

鹽炒研細擦牙溫水漱口吐水洗眼日明齒固

修合日期

五月五日

六月六日

# 眼目

（脉）左寸脉洪數，心火炎上也。關弦而洪，肝火盛也。○右寸關俱弦洪，肝木夾相火之勢而來侮所不勝之金，而剋已所勝之土也。

夫天運拂經，則兩曜薄蝕。人身違和，則兩目眇昏。是眼目之在人，猶日月之麗天，明則其常，而昏則其變也。一身之中，惟目最爲貴重者，臟腑之精華，萃爲血脉之宗，會繫焉。東垣曰：按陰陽應象論云：諸脉皆屬於目。又曰：目得血而能視。五臟六腑之精氣皆上注於目，而爲之精。精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲目窠之總絡，氣之精爲白眼，肌肉之精則爲約束，裹橫筋骨，血氣之精而與脉併而爲系，上屬於腦，後出於項，是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤目法於陽。故陰陽合德而爲精明，也是以五臟六腑十二經脉三百六十五絡其血氣皆稟受於脾，土上貫於目而爲明，故目者心之使也，心者神之舍也。若精神虧

而不守卒然覺非常之怪邪中其精則精散則視岐觀于物爲兩也因  
事煩擾飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火太盛則百脉沸騰血脈  
並行經曰天明則日月不明邪害空竅是也董院使曰目之首尾赤嗜  
屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑  
瞳一點如漆者腎實主之是隨五臟各有證應然論其所主則瞳子之  
關係重焉何以言之目者肝腎外候也肝取木腎取水水能生木子肝  
母腎烏有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣  
乏則眵眊眩暈烏輪赤暈刺痛滑數此肝熱也膽生清淚枯黃遙睛此  
肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也  
又曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下胞或目唇間如疥點者其  
熱在脾又曰眼者輕膜裹水照徹四方漣源反本非天上之水入其就  
爲之主宰乎机而論之則拘急牽縴瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是  
之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅眵淚濕凝裏熱刺痛是之謂熱眼運而

淚胞腫而眇。上壅。朦朧。酸澁。微赤。是之謂氣眼。其或風與熱并。則癢而浮赤。風與氣搏。則癢滿昏沉。血熱交聚。故生淫膚粟肉。紅縷偷針之類。氣血不至。故有眇視。胞里雀眼。盲障之形。淡紫而隱紅者。爲虛熱。鮮紅而兼赤者。爲實熱。兩眦呈露。生努肉者。此以熱血旺。白睛紅膜如小傘者。此氣滯血凝。熱證。瞳仁內湧。白睛帶濕色浮而赤也。冷證。瞳人青綠。白睛枯槁。氣沉而濁也。眼熱經久。復爲風冷所乘。則赤爛。眼中不赤。但爲痰飲所注。則作疼。肝氣不順。而來熱。所以羞明。熱氣蓄聚。而傷胞。所以脾合劉河間曰。在瞳則爲表。當除風散熱。在膜則爲裏。當養血安神。如暴失明。昏澁。翳膜。眇淚。斑入眼。此風熱也。一云。斑入眼。此肝氣盛而發在標也。宜表散以去之。如腎弱。不欲視物。內障見黑花。瞳子散大。皆裏也。血少神勞。腎虛也。宜養血補水。安神以調之。觀諸公所論。治療之法。大槩以清心涼肝調血順氣爲先。不可固執水能生木之說。而偏補養。蓋腎水惡燥。設遇虛證。亦不過以當歸地黃等藥潤養之。輕則溫補。

之亦何也。况夫肺能發燥，肝亦好潤。古方壅用杏仁、乾柿、飴糖、沙蜜、錫  
佐果，非潤益之意乎。抑且脾者，諸陰之首，目者血脉之宰也。故脾虛則  
五臟之精氣皆失，所司不能歸明於目矣。心者君火也，主藏神明，宜靜  
而安。相火化行，其令相火乃胞絡之火，主百脉皆榮於目。既勞役妄動，  
又因邪氣所併，而損血脉，是故諸病生焉。翳目者，雖宜養血安神，又當  
兼理脾胃。良法也。至於退翳一節，尤關利害。凡翳起於肺，肺家受熱，  
輕則朦朧重則生翳，有曰真珠翳，狀如碎米者，易散。有曰梅花翳，狀如  
梅花者，難消。雖翳自熱生，然治法先退熱，而後退熱者，謂熱極生翳，若  
先去赤熱，則血爲之凝，而翳不能去。其有赤眼與之涼藥過多，又且滌  
之以水，不反掌而水凝眼特一團水耳。水性清澄，尤不可規規於點洗，  
緣其意欲失節，嗜慾無度，勞役眼力，泣涕過傷，寒風衝目，目日不  
避烟火，飲啖諸多，此皆患生於臟腑者也。專事點洗，可乎哉。在乎察受  
病之因，究標本之理，推明運氣以調之，斟酌藥餌以平之，患者又能靜

坐間居澄神息慮節飲食戒色慾專內視簡外觀愛護目力則無有不  
安者矣。

○一論暴發眼腫如桃并赤眼痛澀難開者  
祛風清熱散

當歸尾

赤芍

芎芩

生地黄

黃連

黃芩

梔子

連翹

薄荷

防風

荆芥

羌活

桔梗

枳殼

白芷稍

甘草

右剉丁劑燈草七根水煎食後服。○腫痛甚加大黃芒硝。○風熱加蔓  
荊子牛旁子。○烏珠痛加天麻川烏生用。○犯眼加蒼朮朱砂。○眼生  
翳障加白蒺藜。○眼目被人打傷青腫加大黃。○如杖瘡腫痛未破作  
增寒壯熱或打重血氣攻心加大黃梔子。○如打撲傷損內重瘀血不  
散加桃仁大黃服之立愈。

○一論治眼暴發赤腫臉高苦痛不可分者  
救苦湯

連翹

桔梗

紅花

細辛 各二分

當歸身

夏月減半

甘草

炙各一錢

蒼朮

米泔浸

龍膽草 各一錢四分

羌活

太膠

升麻

陽明

柴胡

少陽

防風

藁本

黃連 各二錢

生地黃

黃柏

黃芩

知母 各三分

川芎 六分

右剉丁剉水煎臨卧服

○一洗火眼赤眼暴發腫痛不可忍者

黃連

黃柏 各一錢

生白礬 二分

右剉膠棗丁枚煎水半鍾洗之立消

○一洗暴發爛弦風眼

用皂莢不拘多少在器盛於二伏內晒之至白色須晒十餘日方好

再入黃連末十分之一。每用少許水和。隔洗眼立效。

○一治眼暴發腫痛。

用白礬枯過爲末。每用三錢以生薑去皮取自然汁調如膏。抹帛上。令患人閉目。將藥貼眼上。燒煙香盡。痛即止。用溫水輕輕洗去。神效。

○一外治火眼腫痛。

用青礬炒三錢。黃土六錢。各爲細末。井花水調作二餅子。如眼大先將水洗淨眼。次用餅貼眼上。後用餅子貼帛上。病人仰睡。用水潤餅。如乾再潤。三時即已。

○一治眼暴發赤腫。痛淚隱澁難開。

用大黃末新汲水調塗兩眉正上頭兩腦水潤之。須臾腫消痛止。

○一治法如前。

用黃連末五錢。薄荷二錢半爲末。用雞清和。隔帛塗眼上。良久乾則以水潤之。即效。



○一論凡眼疾暴發新久腫痛不可忍者皆緣心家火起所致也并治一切翳障等疾

光明丸 李中山傳

生地黄

白芷

羌活

獨活

甘草

薄荷

防風

荆芥

木賊

甘菊花

草決明

黃連

黃芩

黃柏

大黃

連翹

桔梗各二錢歸尾

川芎各三錢

石十九味為末煉蜜為丸如菉豆大每服三五十九白熟水送下清晨

晚上各進一服

○一論暴發眼

瀉火片陽湯

黃芪八分

人參七分

甘草五分

柴胡一錢五分

升麻一錢八分當歸三錢

川芎三錢

生地黄三錢

黃芩二錢

梔子二錢

薄荷二錢

菊花二錢

藁本二錢

枳實一錢六分 甘枸杞子二錢 龍膽草二錢

右剉一劑用水一鍾酒一鍾煎至二鍾臨臥服渣再用水三鍾煎至一鍾溫服即愈如未全愈將第三次渣用水二鍾煎至一鍾溫服忌食腥  
○一論內障眼得之脾胃元氣虛弱心火與三焦俱盛飲食失節形體勞  
役不得休息故上爲此症也

冲和養胃湯

黃芪一錢五分 人參一錢

甘草炙一錢 五當歸酒洗一錢

白朮

去蘆一錢

白芍

酒炒六分

白茯苓三分

柴胡七分

升麻一錢

葛根一錢

羌活一錢五分 防風五分

黃連七分

黃芩七分

乾薑一分

五味子二分

右剉一劑水煎稍熱服

○一論肝主目肝受熱而不能視血弱則肝氣無以榮養用氣不榮則有

花也。久視艱澁太腎赤色。此血不足肝之失養也。迎風有淚。腎之虛也。黑睛上有翳不散。此亦因勞受風。血氣不能行也。宜服此藥補肝血。然膽水益腎氣大有殊効。

家傳養肝丸

羚羊角

鎊另研五錢

生地黄

酒浸

熟地黄

酒蒸

肉蓯蓉

酒洗

甘枸杞子

防風

去蘆

草決明

炒

菊花

羌活

當歸

酒洗

沙苑蒺藜

一兩

楮實子

炒五錢

羊子肝

小肝菜煮焙乾爲末

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸。加至七十丸。至百丸。早服。

湯下。午茶下。臨臥酒下。不飲酒。人當歸湯下。即補肝重明丸。去赤芍。甘草。

○一論素稟虛弱。勤勞。眼目昏暗。

當歸

酒洗五分

一錢

白芍

酒炒一錢

川芎

一錢

生地黄

二錢

人參

五分

白朮

去蘆一錢

黃柏

入乳炙炒一錢

知母

入乳炙炒一錢

密蒙花 五分  
克蔚子 一錢  
龍膽草 酒洗 四分  
黃芩 酒炒 七分

右剉一劑水煎服。

○一論病目用涼藥過多以致隱澁難開。

防風 七分  
黃芪 一錢  
甘草 炙 五分  
蔓荊子 三分

當歸 五分  
白芷 三分  
升麻 七分  
柴胡 五分

右剉一劑水煎服。

○一論日晡兩目紫澁不能瞻視此元氣下陷也。

補中益氣湯方見內傷依本方倍參芪。

○一論腎水枯竭神光不足眼目昏暗此壯水之主以制陽光。

壯水明目丸

熟地黃 一兩二錢  
山藥 一兩二錢  
澤瀉 八錢  
山茱萸 酒蒸 二錢

白茯苓 兩云皮一當歸 酒洗 兩  
川芎 三錢  
生地黃 五錢

牡丹皮 八錢  
蔓荊子 一兩  
甘菊花 五錢  
黃連 五錢

柴胡三錢

五味子五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸酒送下

○一論遠年近日爛眩風眼翳障青盲腫痛百病

點眼仙方 臨川馬休所傳

麝仁

三錢半重層捲煖

去皮將竹帚碾去油方入藥用筆筒捲將藥鋪上

珍珠

二分五厘生用綿布包

打碎琥珀二分生用布包打碎研爛

熊膽

一分五厘生研

牛黃一分生用

麝香

半分生研

片腦一分五厘生研

蜂蜜

三錢五分生用溫化攪去渣

右先秤眼藥罐次如蜜秤後入藥攪已上八味和勻點眼

○一論暴發風熱時行火眼神效

紫金錠 陳省齋秘傳方

川黃連四兩剉粗末將井花水十鍾浸二千日入鍋煎至三鍾去渣

再熬至半鍾下米膠一錢二分溶化調後藥為錠

銅綠五錢

輕粉二錢

官粉三兩

右共為細末以黃連汁調為錠陰乾用時以井水磨加熊膽五分水片二分尤妙

乙一論兩目翳障爛弦風熱昏瞶色眼皆治  
光明散

蘆甘石上好的用四兩

珍珠四錢

右二味用竹帛包定將硝銀新紫泥罐作餅包石珠在內為凡外用煎膽一錢硃砂二錢火硝三錢研末為衣再用紫泥罐包裹曬乾用炭火煅煉以七根線不為度煉四炷香用重氣吹之沙黑色為妙又煉根半香以好醋濯之又煉根半香歇火聽用煎煉過末藥一錢加熊膽一分火硝一分為極細末點眼其效如神

○一論遠年近日內障青盲雲翳堆聚火眼暴發迎風冷淚怕日羞明肝

腎虛邪等疾點之悉愈能治七十二種眼疾能醫二十年目不通明者  
惟有瞳人反背而驚散者不治

仙傳珊瑚紫金膏 薛兵巡秘傳

白蘆甘石

南方名羊脂蘆石重便七日用灰火銷銀砂鍋內煨

黃丹

商省名國丹滾水飛過三次晒乾細研一兩

海螵蛸

即烏賊魚骨刮者皮申微火煮過細研二錢

乳香

光明者入砂鍋微火炒出烟細研二錢

沒藥 光明者入砂鍋內微火炒去烟細研二錢

白礪砂

光明者二錢細研

麝香

揀淨去皮細研五分

青鹽

去泥土細研五分

片腦

細研三分

右將前七味各研細秤足合下處入乳鉢內再研極細無聲後入麝片  
二味再研極勻將蜂蜜用絹袋濾過熬蜜滴水成珠夏老冬嫩春秋  
老嫩之間用酒調藥令稀稠得所磁器內封固不可泄氣點服神效

○一人兩目作痛服降火祛風之藥兩目如針熱倦殊甚余用十全大補湯數劑諸症悉退服補中益氣湯兼六味丸而愈復因勞役下後目滿體倦服十全大補而痊

○一人年二十素嗜酒色兩目赤痛或作或止兩尺洪大按之微弱余謂少年得此病自當失明翌早索途而行不辨天日果皆然余以六味丸料加麥門五味二劑頓明

○一人目赤不明服祛風散熱藥反更明重聽脈大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加扶神散棗山藥石菖五味類愈又勞役衍甚用十全大補兼以兩藥漸愈再用補中益氣湯加兩藥而痊

○一儒者日晡兩目眩暈不能瞻視此元氣下陷用補中益氣倍加參芪數劑全愈

○一論眼病之後微有上熱白睛紅多眵淚每痒痛而隱澀雖謂此是寒太過而真氣不能通九竅也故服目昏花不明以益氣湯大參才疎加



防風白芷蔓荆子

○一論內障眼得之元氣脾胃虛弱心火與三焦俱盛飲食失節形體勞役不得體息故上為疳症也以益氣湯加白芍茯苓葛根羌活防風黃連黃芩乾薑五味去陳皮

○一論諸般翳障翳睛努肉內障青盲等症

益府秘傳撥雲龍光散

麤仁

五兩去粗皮取仁用溫水浸去糠皮膜尖心用上好白竹帛包

白朱砂

放即好白細研密四錢重入頭煨醋一錢將器以沙

好珍珠

以七七次為度將研細以米澄淨用中開的陰乾五分

真能膽

三分以砂五盛放火上烘去水用二分五厘

硃砂

三四分將硃砂一碗以火煮乾為炭用二分

硃砂二錢五分牛黃二分五厘琥珀五分

水片一分

當門子一分 白丁香一分 海螵蛸水煮過六七次二分

人龍<sub>龍子</sub>入<sub>子</sub>口內吐<sub>也</sub>食<sub>也</sub>即<sub>用</sub>銀<sub>絲</sub>破<sub>開</sub>河水洗<sub>刮</sub>令<sub>淨</sub>

右精製一處細研任<sub>意</sub>點<sub>眼</sub>者復明<sub>古今</sub>天下第一仙方不可<sub>妄</sub>傳

匪人秘之秘之

一治氣血虛損眼目昏暗此壯水以制陽火有悞服寒涼之過黑暗全

不通路以十全大補湯加沉香大附子白豆蔻

東垣謂目能遠視不能近視火盛而水虧也法當補腎六味地黃丸主之

目能近視而不能遠視有水而無火也法當補心定志丸加茯苓主之

又曰不能近視畏服地黃丸不能遠視臥服定志丸是皆道手足少陰

經也是以知不能近視者腎水虧火盛也不能遠視者心虛不足也

定志丸

遠志去心

石菖蒲各二兩 人參一兩

白茯苓三兩

加白茯苓二兩

右為未煉蜜為丸朱砂為衣每服二十丸米湯下  
六味地黃丸方見補益

# 喉痺

附聲啞 疰腮

脉兩寸脉浮洪而盛者喉痺也。脉微而伏者死。

內經曰一陰一陽結謂之喉痺。一陰者手少陰君火。心主之脉氣也。一陽者手少陽相火。三焦之脉氣也。一脉並絡於喉氣氣熱則肉結結甚則腫脹腫脹甚則痺痺甚則不通而死矣夫推原上二經惟足太陽則下項其餘皆湊于喉嚨然內經何獨言一陰一陽經為喉痺蓋君相二火獨盛則熱正絡故痛者速也。余謂一言可了者火也故十二經中言喉乾聲痛喉腫舌本強皆君火為之也惟咽痺急速相火所為也夫君火者猶小火也相火者猶龍火也。小火焚木其勢緩龍火焚木其勢速內經之言喉痺則與咽舌其兩間耳然其病同於火故不分也後之

字下  
在結

醫者各詳其狀，強立八名，曰：單乳蛾、雙乳蛾、子舌脹、木舌、緩、纏、喉、閉、定、馬、喉、閉、熱、氣、上、行、故、轉、於、喉、之、兩、側、近、外、腫、作、以、其、形、似、是、謂、乳、蛾、一、爲、單、一、爲、雙、其、此、乳、蛾、差、小、者、名、喉、閉、熱、於、舌、下、復、生、以、小、舌、子、名、曰、子、舌、脹、熱、結、於、舌、中、舌、爲、之、腫、名、曰、木、舌、脹、木、者、強、而、不、柔、和、也、纏、結、於、咽、喉、腫、達、於、外、且、麻、且、痒、腫、而、大、者、名、曰、纏、喉、風、疾、痺、暴、發、痰、涎、名、曰、走、馬、喉、風、此、八、種、之、名、雖、詳、若、不、歸、之、火、則、相、去、遠、矣、其、微、者、可、以、鹹、麥、之、而、大、者、以、辛、散、之、今、之、醫、者、皆、有、其、藥、也、如、鍾、衛、易、頭、頸、痙、白、粉、針、硝、銅、綠、之、類、也、至、於、走、馬、喉、風、何、特、此、乎、其、生、死、人、反、掌、之、間、耳、其、最、不、誤、入、者、無、如、砭、針、出、血、血、出、則、病、已、易、曰、血、去、楊、出、良、以、此、乎、昔、余、治、一、婦、人、木、舌、脹、其、舌、滿、口、諸、醫、不、愈、令、以、錐、針、小、而、銳、者、砭、之、五、七、度、腫、減、三、日、方、平、計、所、出、血、幾、至、盈、斗、又、治、一、男、子、纏、喉、風、腫、表、裏、皆、作、紫、不、能、下、余、以、涼、藥、灌、於、鼻、中、下、十、餘、行、外、以、拔、毒、散、傅、之、陽、起、石、燒、碎、與、伏、龍、肝、子、等、分、細、末、之、以、新、水、掃、百、遍、三、日、熱、始、愈、腫

始消。又嘗治一貴婦，嗟痺，蓋龍火也。雖用涼劑，而不可使冷服，藉龍火宜以滅，逐之，入火者，烹飪之火是也。乃使曝於烈日之中，登於高堂之上。令待如沸，火爐坐藥，銚于上，使藥常極熱，不至太沸，通口，時時咽之。百餘次，然火自散。此法以熱行寒，不爲熱而打格故也。木抵治痰痺，用針出血，最爲上策。但人畏針，委曲求之，瞬息喪命。凡用針，而有針創者，宜搗生薑塊調以熱白湯，時時咽之，則創口易合。銅人中亦有灸法，然痛微者可用。病速者，恐遲則殺人，故治嗟痺之人，與救火同，不容少待。內經火鬱發之，發謂發汗。嗟咽中豈能有汗？故出血者，乃發汗之一端也。後之君子，毋執小方而曰吾藥不動臟腑，又妙於出血者，幸遇小疾而獲効，不幸遇大病而死矣。毋遺後悔可也。

○一切嗟痺危急，死在須臾，若關緊閉

病人，太指外邊指甲下，根不問男左女右，只用布針針之，令血出，卽効。如太段危急，兩手太指俱針之，其功尤捷。

○一論治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

龍腦破毒散

盆硝研細四錢 白殭蠶微炒八分 去青黛八分 甘草生八分

蒲黃五分 馬勃三分 片腦一分 麝香一分

右各為細末神足同研極勻磁盒收貯如有病症每用藥一錢以新汲水少半盞調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自藥消散若是諸般舌服用藥半錢以新釀麝擦在舌上下嚥津唾如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

馬勃一名馬左菌也虛軟如絮紫強之紫灰出狀如狗肺生濕地園中久腐處主惡瘡馬疥傳諸瘡良以蜜搽拌以水調呷治喉痺咽痛

○一論咽喉腫痛痰涎壅盛初起或壯盛人上焦有實熱者可服

清咽抑火湯

連翹一錢五分 片苓一錢 梔子一錢 薄荷七分

防風一錢

桔梗二錢

黃連一錢

黃柏五分

知母一錢

玄參一錢

牛蒡子一錢

大黃一錢

朴硝一錢

甘草五分

右剉一劑水煎頻頻熱服○聞生過楊梅瘡者加防風山奇糧二兩

○一論瘡火上升喉痛并喉內生瘡喉閉熱毒最能降火滋陰

滋陰降火湯

當歸一錢

川芎一錢

白芍一錢二分懷熟地黃一錢二分

川黃柏蜜水炒知母生一錢

天花粉一錢

白桔梗去蘆二錢

甘草生三錢加玄參一錢

右剉水煎入竹瀝一盞溫服

○一論喉痺腫痛聲啞不出飲食不下陰虛相火上炎咳嗽痰喘潮熱虛勞等症內服此藥外以神仙通隘散吹之立愈

滋陰清火湯

懷熟地黄一錢 山藥一錢 白茯苓去皮一錢 山藥一錢

牡丹皮一錢 澤瀉一錢 桔梗二錢 玄參一錢

黃柏鹽水炒一錢 知母一錢 天門冬去心一錢 麥門冬去心一錢

甘草一錢

右到一劑水煎服外用硼砂下味喻化嚥下降痰消毒如神

○一論咽喉腫痛屬素虛弱者或服涼藥過多而作瀉者皆可服

清上養中湯

小甘草 桔梗各二錢 玄參 當歸

黃芩各一錢 陳皮去白 白朮去蘆 白茯苓去皮

麥門冬去心 連翹各八分 人參 防風

金銀花各五分

右到水煎食遠類服有痰加貝母

○一論喉痺腫痛不能言語或吐或瀉或不食或四肢冷痺但口難開



不愈者此從治之法也

通關散

炙甘草一錢五分

人參

白朮去蘆

白茯苓去皮

桔梗二錢

防風七分

荊芥

薄荷各五分

藳蘆炒

或加大附子炮各五分

右剉水煎頻頻與服

○一論喉痺雙單乳蛾風腫吐熱不下死在須臾治一切喉痺之總司也

山豆根為末用熊膽和為丸用雞脰皮陰乾研末為衣丸如菉豆大每用下丸放香上徐徐嚥下立愈

○一治喉風等症

起死回生散

蜈蚣三錢焙存膽礬一錢

全蝎三錢燒存殭蚕去絲嘴炒一錢

蟬退一錢焙存膽礬三錢

穿山甲三錢燒乳香五分

川烏 炙一錢

右爲末，每服一錢五分，或二錢。小兒每服一分，或六七釐，用葱頭搗爛，和藥酒送下。出汗爲度。如口不開，灌服。忌雞豬羊油麵七日。

○一論單蛾雙蛾風喉喉痺腫痛水漿不入，死在須臾。寶崇周嫺家試驗：膽礬一錢五分，硃砂一錢八分，雞內金煨過一，枯白礬二錢，百草霜三錢，以衆末黑爲止。

右各爲細末，用絹羅過，用中指蘸藥，按上患處，又咬令痰多去。後用薄荷湯漱口。如甚將鵝翎削尖刺破，用藥按上，或用鵝毛蘸醋帶藥，刺上滿口，刷攪引痰出盡，則愈。○一方加熊膽五分更效。

茶子

霜梅

醃醋

右三味研爛，去渣，將藥汁蘸掃咽喉，即時吐痰而愈。

○一論喉痺腫痛湯水不下，死在須臾。用此一吹，卽活。

牛黃二分

硼砂一錢

雄黃三分

右為細末，每用一分五厘吹入喉內。

○一論喉癰腫痛，車左源傳效。

鬱金一錢

雄黃五分

巴豆肉

去壳，四箇二箇半，用二箇用猪油包好，上燒熟，在性。

右為末，三味攪勻，每用一分二厘入竹筒內吹患處，小兒用六厘。

○一治喉閉風閉難治者。

猪牙皂角一條，用蜜調和水煎，如急立服，緩則露一宿，尤妙。如倘口緊者，擊開灌之，須將危者即與。

○一治喉風危急。

用大黃為末，竹筒盛之，安青魚膽七箇入末，待乾研末，聽用。遇患喉癰吹入鼻中，或喉中，立効。

○一論時氣纏喉風漸入喉塞，水穀不下，牙關緊急，不省人事。

神應散

雄黃

枯礬

藜蘆生用

牙皂炙黃

右各等分爲細末每用豆大一粒吹入鼻內吐痰神效

○一論喉痺乳蛾咽喉腫痛湯水不入死在須臾

巴豆去壳搗爲末入細辛末少許全研勻捲在香內中間斷如左患塞右鼻右患塞左鼻孔中雙腫左右相替塞之咽喉立開神效

○一論喉痺腫痛水漿不入死在須臾扶溝劉昆涯傳

先以皂角細辛爲末擦牙次用陳藍松葉燒灰霜梅肉生艾葉搗爛全扎於快頭上蘸喉數次吐痰盡即食百沸湯後用米粥調服

○一治咽喉腫痛

百藥煎

硼砂

甘草

生白礬各等分

右四味爲細末每服一錢食後米飲調細細呷嚥

○一論纏喉風腫痛

皂角爲末醋調塗外頸上乾則易其乳蛾即破而愈

○一論喉風腫痛不可忍者

霜梅五七箇去核白礬二兩研爛用好醋一碗入藥同煮以礬化為度待溫用快扎綿繖商上下至喉先繖牙外自外而繖至舌下舌下又繖至舌上繖至喉其痰自湧出痰帶絲者即愈無絲者絲斷不沿

○二論喉痺壅塞不通者

用紅藍花搗繖取汁一小鍾服之以為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服效

○一論咽喉腫痛

吹喉散 周印池傳

牙硝一兩五錢 硼砂五錢

雄黃二錢

冰片二分

殭蠶二錢

右共為細末每用少許吹喉立効

○一治咽喉腫痛水吞不下

用青蓋白礬礬砂各等分為末吹患處有痰吐出而愈

○一論咽喉腫痛水漿不入死在須臾

真蟾酥為末用林頭點入對嘴上即時消散其效速如風

○一論久嗽喉痛

小太平丸

人參二分 五味子三分 天門冬 去心二錢 麥門冬 去心二錢

玄參八分 微墨三分

右為細末煉蜜為丸噙化下○痰盛加貝母

○一論勞役過傷忽咽喉腫閉不省人事喘促痰湧汗出如水肢體痠軟脉浮大而數此飲食勞役無根虛火上炎也

補中益氣湯方見內傷依本方加肉桂煩麝

○一論咽喉腫痛口舌生瘡勞則愈甚此肺肺氣虛勝眊有熱也

補中益氣湯方見內傷依本方加玄參酒炒黃柏知母稍愈去知柏加山

藥山葉黃

○一論咽喉痛服涼藥過多或過勞痛愈甚此中氣虛熱也

補中益氣湯方見內傷依本方加炒蒼連

○一論積熱上攻痰涎壅盛喉痺痞滿腫痛難禁

上宮清化丸 內閣秘傳

黃連 去毛 桔梗 去蘆各六分 山豆根

粉草各四錢

薄荷葉 一錢 白礪砂 六分

右為細末煉蜜為丸如芡實大時常嚥化

○一論喉痛有痰聲啞

薄荷 二兩 細茶 一兩 白礪砂 七錢 烏梅肉 二十一箇

貝母 一錢 冰片 三分 孩兒茶 五錢

右為細末煉蜜為丸如皂角子大每嚥化下

○一論聲啞

甘草

烏梅

桔梗

烏藥

右剉水煎溫服。

○一治出聲音方

訶子

兩炮去核

木香

一兩

甘草五錢

右剉水煎入生地黄汁一合再煎熟沸放溫分六服食後日進半料。

○一論聲嘶失音。

鐵笛丸

當歸

酒洗

一兩

懷生地黃

一兩

懷熟地黃

一兩

天門冬

去心

炒五

麥門冬

去心

錢黃

拍蜜炒

一兩

知母

五錢

人參

三錢

白茯苓

去皮

一兩

訶子

五錢

阿膠

炒五錢

烏梅肉

十五箇

人乳

一破

牛乳

一破

甜梨汁

一破

右爲細末煉蜜爲丸如黃豆大每服八九十九訶子湯下羅蘆湯亦可。

○一治失音。



用梨花新瓦上炒熟懷之隨處細嚼工十粒久久自愈

○一治失音

用生白礬煉蜜為丸服効

○一治聲啞失音不出

用蜜入猪板油切爛入蜜內車湯煮熱食之

○一論痃腮腫痛

防風 荆芥 羌活 連翹 牛蒡子 甘草各等分

右剉水煎服外用赤小豆末醋調敷熱毒氣入喉難治○一方用右庄不拘多少炒七次地下窰七次醋調塗腫處立愈

○一論治痃腮疔瘡腫痛及吹乳

南薄荷三錢 斑猫去翅足炒三分

右為末每服二分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散二服

○一治喉中生肉以綿裹快頭蘸鹽酒肉上日六七度易

○一人患喉閉以防風通聖散治之腫不能噤此症須針之乃可奈牙關已閉遂刺少商穴出血口卽開更以膽酸吹患處吐痰一二碗許仍投前藥乃愈嘗見患此疾者長針不刺多刺少商穴在手大指內側去爪甲角如韭葉許

○一人喉閉腫痛寒熱脈洪數此少陰心火少陽相火二經爲病其症最惡惟刺患處出血爲上因彼長針先以涼膈散服之藥從鼻出急乃願刺則牙關已緊不可針遂刺少商二穴以手勒去黑血口卽開仍刺喉間治以前藥及前吹喉散吹之頓愈又以人參敗毒散加芩連玄參牛旁子四劑而平經曰火鬱發之謂發汗出血乃發汗之一端也河間云治喉之火與救火同不容少怠嘗見喉閉不去血喉風不去痰以致不救者多矣每治咽喉腫痛或生瘡毒以荊防敗毒散加芩連重者用防風通聖散

○一男子口舌常破如無皮狀或咽喉作痛服諸涼藥愈甚予以理中湯

劑乃愈。

○一人脚發熱則咽喉作痛。內熱口乾痰涎上壅。此腎經虧損火不歸經。用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而痊。

○一人患喉痛日晡益甚。此血氣虛而有熱。用八珍湯而愈。後每入房發熱頭痛。用補中益氣湯加麥門五味及六味丸常服。後不復作。

○一丹溪先生云。咽喉痛屬血虛。用四物加竹瀝。陰虛火上炎者。必用玄參氣虛加入參竹瀝。又云。咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越痰結在上者。脉必浮大重取必盛。去死為近。宜入參一味。濃煎細飲之。如作實症治之。禍如反掌。此發前人所未發。救無窮之天枉。

○一人因怒氣大叫。將下腮脫落。任極不上。眾視措手。子以烏梅餅餅塞於兩腮。坐牙盡。頭控處張口。流涎須臾。隨手擦上。

補遺

○一治喉痛如生毒物。并車蛾雙蛾喉嚨血溢。

巴豆半夏各等分將此二味用上好醋放小罐子裏煎熟取巴豆半夏一起研末用麻布包做數粒如豆子大以前醋浸之取一粒含在喉痛處至乾又換別粒含之直至吐瀉而後已既以稀粥補之而愈忌冷水猪油。

○一利膈生津止渴消食常用之藥也。

烏梅一兩 蘇刈薄荷葉四兩

右為細末白糖霜四兩蜜丸如芡實大每用下九嚥化。

○一治喉風咽痛雙單乳蛾 姜師厚傳

烏梅去核竹筴插在涎螭身上陰乾取燒灰存性為末點患處立已。

○一治咽喉腫痛生瘡聲嘶危急之甚及治虛勞聲嘶喉痛。

神仙通隘散 賈蘭峰秘方。

白硼砂二錢 孩兒茶一錢 蒲黃六分 青黛一錢

牙硝六分 枯礬六分 片腦二分 黃連末五分

白滑石一錢 寒水石一錢 黃柏末五分

右為末吹喉中立刻效。

○一治喉中熱毒腫痛喉閉乳蛾等症。  
清上丸

熊膽一分

雄黃五分

硼砂一錢

薄荷葉五錢

青鹽五分

膽礬少許

右為末煉化白沙糖為丸如芡實大。凡時舌壓二九自化入喉神效。

○一治聲音不出。

真蘇子二兩

訶子三箇

杏仁三十箇

百藥煎二兩

右為末每服二三錢熱酒調下。

○一要欲好聲音。

用杏仁一升熬去皮尖酥。一兩蜜少許為丸如梧桐子大。空心米湯送下十五丸。

○一治失音

皂角一枚去皮子蘿蔔二箇切作片水煎服之不過三服能語聲出

# 結核

結核者火因痰注而不散鬱結堅硬如果中核也或在頸脇或在手足或在頭顙或在臂在腋如腫毒不紅不痛不作膿不必潰發但令熱氣散則核自消太法宜二陳湯加竹瀝多服爲妙

梅核氣者窒碍於咽喉之間咯之不出嚥之不下如梅核之狀者是也。因喜怒太過積熱蘊隆而成屬痰鬱結致有斯疾耳治宜導痰開鬱清熱順氣加陳皮半夏川芎香附山梔黃芩枳殼蘇子之類是也如老痰凝結不開以鹹能軟堅之藥海石是也。

○一論咽喉結核成塊如核梅者腫硬疼痛四腋下俱有及頸項腫硬不能轉頭

消解散

南星泡

半夏姜炒

陳皮

枳實

桔梗

前胡

柴胡

黃連

連翹

赤芍

防風

獨活

白附子

白芥子

蔓荊子

莪朮

木通

蘇子

甘草

右剉生薑燈草煎服。

○一論不問男婦遍身疙瘩成塊如移不紅不痛皆痰流注而成結核也  
醉翁仙酒 方上異人傳

白頭翁一斤去葉用根分作四服每下服四兩用酒煎一日三次服之。二日服盡而已。

○一秘方 治症同前効不可言。

草麻子一斤去殼用肉入放公猪肚內酒煮肚爛為度取出草麻子晒乾為末用前爛猪肚拌干下為丸酒送下。下日服三次。

一論婦人遍身痰核，不紅，不腫，不疼，內消之劑。

陳皮

半夏

白茯苓

當歸

川芎

白芍

枳實

黃連

香附

桔梗

連翹

防己

羌活

龍膽草

柴胡

甘草

右列生薑三片。水煎服。

○一論結核，渾身手足俱有核，如胡桃者，并治胸中胃脘至咽喉，皆痰核也。

開結通痰湯

陳皮一錢

半夏七分

枳殼一錢

枳實七分

桔梗五分

前胡八分

黃芩一錢

香附童便浸三分

荆芥七分

羌活七分

木香五分

檳榔八分

殭蚕二分

射干七分

威靈仙七分

甘草七分



右劉下劑生薑三片煎服。

○一論痰核氣核疔腮疔瘡及吹乳等症。

內消散 朱賓湖得効。

南洋荷葉三錢

斑猫去翅足炒三分

右為末每服三分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散以導  
子清丸如蔓豆大每服下丸茶下加至五丸却每日減下丸減至二丸  
後每日服五丸治癰瘰名內消丸。

○一論痰核方 庠生分石伯傳

歸尾一兩

赤芍稍一兩

五

連翹一兩

蒙本七錢五分

細辛八錢

羌活一兩

獨活一兩

防風一兩五錢

荆芥八錢

薄荷一兩

桂枝一兩

赤芍一兩

小川芎六錢

白芷稍一兩

甘草節六錢

右為末每服三錢食後酒調服。

防風一兩五錢

山慈菴  
一兩

川山甲七錢

射于二兩

紅肉銷二兩

白芷稍一兩

車前子 一兩

漢防已二兩

何首烏二兩

牛旁子

連翹

桔梗各一兩五錢

烏藥  
一兩

金銀花

夏枯草 各二兩

薄荷一兩

獨活  
一兩

姜蚕  
一兩

半夏  
一兩

赤芍 一兩五錢

皂角刺二兩

小川芎 一兩

當歸尾  
一  
144

甘草五錢

右剉剉水煎食後服。○有潮加柴胡黃芩各五錢。

○一男子素善怒左項微腫漸大如升用清痰理氣而太熱作渴小便頻濁余謂腎水虧損用六味地黃丸中益氣而愈亦有胸脇等處大如升斗或破如菌如貓不問大小俱治以前法必多服以愈爲度

補遺

○一治痰癰妙方

陳拓所傳

天花粉三兩

昆布

酒洗八錢 貝母一兩

姜蚕炒一兩五錢

全蝎

酒洗五箇

黃連

炒五錢

土木鱉

去壳十箇

知母一兩

川山甲

土炒一兩

陳皮

一兩

青皮

炒一兩

歸尾

七錢

黃芩

酒炒一兩

連翹

去心一兩

紅花

五錢

海藻

酒洗一兩五錢

施子

一兩五錢

蒲公英

二錢

夏枯草

一錢五分

右將前十七味君臣藥分作十劑其蒲公英夏枯草每劑各照數用白

水煎服時加濃酒一杯同服

○一治癰核金星膏 蘇九寧傳

金星鳳尾草

一兩五錢

實竹葉

一兩 葱白三十根

側柏葉

一兩五錢

右用香油一斤浸藥一日用火熬着藥焦黃爲度用細布袋濾去渣仍入鍋熬熟油一斤淨入上好鉛粉三兩用竹攪勻文武火熬看起烟黑色再入鉛粉四兩着四五十下鍋仍用竹不往手攪勻滴水成珠連鍋

放在地上再攪去火毒。

○一治瘰癧核氣核。陳出雲傳

黃芩一錢三分 枳實一錢

連翹一錢 海帶七分

白芥子八分 甘草三分

右剉水煎食後服。

○一治瘰癧核。

用拍子葫丁斤。晒乾為細末。每用末二兩。又將天門冬連翹各用

二兩為末。入小布口袋內。將白米酒二小瓶。煨熟。蜜三三。食後服。

服一碗。半月內即消。

○一治瘰癧核頸。戴雷門傳

牛蒡子五分 枳實五分

桔梗八分 黃芩八分

殭蚕五分

連翹八分

防風八分

貝母一錢

海藻洗一錢

金銀花一錢

枯礬一錢

夏枯草八分

右剉下劑。白水煎食後服。

○一治痰核。心泉姓傳。

用葦泥作窩。人生白礬四兩。鹿角蛇一條。在窩內陰乾。火煨化為末。每服一分。溫酒調服。立消。

○一治項後側少陽經中疣瘡。不變肉色。不問大小。及日月深淺。或有赤硬腫痛。

生山藥一排去皮 草麻子二箇去壳

右二味研勻。攤帛上貼之。如神。

○一治梅枝氣

加減四七湯

蘇梗

陳皮

厚朴

南星

半夏

茯苓

枳實

青皮

砂仁

益智仁

白晝

神曲炒

檳榔

右劉生喜煎服

# 癭瘤

夫癭瘤者。多因氣血所傷。而作斯疾也。太抵人之氣血。循環無滯。癭瘤之患。如調攝失宜。血凝結皮肉之中。忽然腫起。狀如梅子。久則滋長。癭瘤有五種。曰石肉筋血氣是也。癭有六種。曰骨脂膿血石肉是也。治法癭瘤二者。切不可針破。針破則膿潰漏。則殺久。惟脂癭可破。去脂粉。即為異。不可輕易為。余將癭瘤之分于後。醫者宜審辨之。則不悞也。

消癭湯

海藻洗

龍膽草

海蛤粉各二兩 通草

昆布燒存性

枯白礬

松蘿各一兩

半夏二兩五錢

麥麴一兩五錢 白芷一兩

壽世保元

已集本卷

五十一

右為末。每服五錢酒煎。忌甘草蝦魚猪肉五辛諸毒等物。又要吞礬丸。  
○一論治癰瘤瘰癧。便毒惡瘡久漏不愈者。  
經驗礬丸

白礬生四兩為末。黃蠟二兩溶化。聚手丸如梧桐子大。每服三十丸。  
空心清湯下。

○一論內府秘傳方 治瘰癧

海藻熟水洗淨 昆布洗淨

海帶

海螵蛸

海粉飛過

海螺醋

甘草少許

右如項下搖者。用長螺頸不搖用圓螺。各等分為末。煉蜜為丸。每夜臨臥口中噙化。下丸功效不可言也。

○一論瘰癧神方 兼扶鼠妳痔及瘻肉

用羌花根洗淨。帶濕不可犯錢。須於木石器中搗取汁。用鐵一條。浸半日。或一宿。以魚鱗瘻經宿則落。如未落再換。線不過三次自落。

後用龍骨、葜子亦在脂各等分爲末敷瘡口即合。如無根用元花泡  
水浸，雞子乳奶痔依法用之無不効。

○一論洗瘡秘方

用染指草名金鳳花，下科煎水頻洗。夏用鮮，秋冬春用乾的煎水洗。  
○一治癰驗方

沉香

乳香

丁香

木香

藿香 各一錢五

右用臘月母猪眼子七箇同藥醇好酒蒸二炷香露，下復煎藥乾爲  
末，煉蜜爲丸如白果大，臨臥吞化服，下料効。

○一治頸下卒結瘰癧方

海藻一斤洗去鹹酒浸飲之，加昆布等分爲末，煉蜜爲丸如杏核大，  
含口中稍稍嚥下。

○一治癰消現方

神効開結散



沉香

木香各二錢 橘紅四兩

珍珠口計九粒 入乳膠以生

猪厭子肉

四十九枚 月解猪者生項間如棗子大

右為末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小三五服大者一劑愈忌酸鹹油膩滯氣之物須用除自於靜室修合

肺癰

脉寸口脉數而實者肺癰也其脉短而滑者自痿浮大者難治

夫肺癰者由寒熱之氣內含於肺其氣結聚之所成也蓋因調理失宜勞傷無利風寒得以乘之寒生熱風亦生熱蘊積不散遂成肺癰咳而喘漏右脇隱痛二脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出黃唾腥臭狀如糯米粥者難治有膿而嘔者不可治嘔膿盡而止則自愈若吐黃色膿臭或帶粉紅色者即肺癰也太抵脉細而沉裏虛而變症矣

一 咳吐膿血腥臭不可聞者肺癰也

黃芪蜜水炒防風

金銀花

忍冬藤

金匱草

牛膝

桔梗各等分

右用鴨一隻，殺死，開破入前七味藥，半鴨肚內用好酒煮，酒盡為度，吃鴨藥渣，晒乾為末，酒調服，後服淨膿湯。

淨膿湯

此湯吃鴨後宜服

甘草四兩，剉作三帖，用水煎，服如粥，不得吐，出之服後。

化痰止咳丸

白礬一兩，枯百草霜一兩

右二味為末，滴水為丸，每服三五丸。人參五味子各三錢，煎湯送下，作三日用。

○一論治肺虛

用白鴨一隻，去內臟，用意以仁杏仁各一兩入鴨腹中，候上蒸熟，藥只用鴨肉吃，大能補肺。

○一論肺癰吐膿腥臭

用黃豆以病人口嚼不覺豆之氣味是肺癰也。

○一論肺癰

以薏苡仁略炒為末糯米飲調服入粥煮吃亦可或水煎服下腹血而安。

鐸肺丹

凡治肺癰必以此藥間而服之以護膈膜不致潰透心肺最為切當即茶蠟丸用蜜水送下。方見癰癧。

# 肺痿

肺寸口脈數而虛者肺痿也。

肺痿之候久咳不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如米脂小便數而不利渴者自愈欲飲者欲痰此由肺多唾涎沫而無津者肺痿也。

一論肺痿咳嗽其証辟辟燥咳胸中隱隱而痛肺弱無方  
意以仁散

當歸

白芍

黃芪

人參

五味子

麥門冬

黃芩

桑白皮

百部

黨以仁

右劉生黃煎服

# 心漏

○一論胸前有孔常出血水者謂心漏也。

鹿子丸

嫩鹿茸

去毛

大附子

炮去皮

黃花各等分

右為末聚肉為丸每服三十丸空心好酒送下

○一論腸下生漏瘡如牛眼之狀服水不止

用鹽少許安白牛乳內然後取甘草煎以鹽煎止即瘡類亦能治

牛耳不瘡，取其垢，其諸漏瘡，外周蒜切片放其上，瘡口自合，不數次，灸即愈。

○一論漏瘡血水出不止。

蛇皮燒灰三錢五倍子

龍骨各五錢

川續斷五錢

麝香少許

右為細末，用津唾調傅患處立止。